


Informe nutricional 2019





Resultados Generales de los beneficiarios (sociodemográficos)

En 2019, la Fundación **benefició a 38.349 niños** en programas de nutrición. De estos, **7.674 reportaron información** en tablero de gestión al menos una vez.

Tipo de Beneficiarios	Final 2019	
	Beneficiarios	%
Gestantes	818	10.6
Niños en 1000 días	5148	67
Niños entre 2 y 5 años	1582	20.6
Niños mayores a 5 años	126	1.6
Total	7674	100

Las regiones que reportan mayor número de beneficiarios son: Bogotá (14%, 1097 beneficiarios), Boyacá (12%, 951 beneficiarios) y Cundinamarca sin Bogotá (10%, 763 beneficiarios)



Gestantes

- **4 de cada 5 gestantes (83%) tiene secundaria completa** - Colombia 49.2% (ENDS 2015)/ 57% en 2018- FE
- **1 de cada 2 gestantes es adolescente** (46.2%)- Colombia 17.4% (ENDS 2015) / 43% en 2018-FE
- **2 de cada 3 gestantes (65%)** viven en condiciones de alta **vulnerabilidad** (Puntaje menor a 30 puntos en el SISBEN).
- **2 de cada 3 gestantes (66.6%)** residentes en zonas **rurales** cuentan con **agua potable**. En áreas urbanas esta cifra asciende a 9 de cada 10 (91.3%).



818




5148

1000 días

- **9 de cada 10 niños 1000 días (88%)** tiene acceso a **agua potable**.
- 51.1% de riesgo o DN crónica con agua potable, 68.1% en donde no hay agua potable
- 68.9%, **2 de cada 3 niños**, viven en condiciones de alta **vulnerabilidad**.




Información nutricional – Bajo peso gestacional por regiones



49% de las gestantes con bajo peso gestacional tuvieron hijos con pesos superiores a 3000 gramos.

Durante la atención no nacieron niños con macrosomía (>4000 g).

En Colombia la prevalencia de bajo peso gestacional es 14.2% (ENSIN 2015)



Seguimiento niño a niño

1000 días

Línea base: 2706 niños

**Desnutrición crónica
o retraso en talla en línea
base: 580 niños (21.4%)**

- 1 de cada 2 niños sale de la DNC (44.1%)
- 1 de cada 3 niños sale del riesgo DNC (30.2%)
- Bogotá es la región en donde menos se observó recuperación del indicador de la talla para la edad en los niños 1000 días



**Desnutrición aguda
en línea base: 98 niños
(3.6%)**

- 3 de cada 4 niños sale de la DNA (74.5%)
- Al final de la atención la prevalencia en este indicador es 2.8% (77 niños), disminuyendo así con respecto a la línea base, la cual fue 3.6%
- De cada 2 niños que culminaron con DNA, 1 se clasificó con riesgo de DN crónica o DN crónica



Recuperación de la desnutrición crónica (DNC) en niños 1000 días por regiones

Región Caribe:

- Datos niño a niño: 2 de cada 5 (38.1%) pasó de DNC a nivel de riesgo o adecuación

Región Pacífico:

- Datos niño a niño: 2 de cada 3 (65.7%) pasó de DNC a nivel de riesgo o adecuación

Región Oriental sin Bogotá:


- Datos niño a niño: 1 de cada 2 (49.3%) pasó de DNC a nivel de riesgo o adecuación


Bogotá:

- Recuperación niño a niño: 1 de cada 3 (35.1%) pasó de DNC a nivel de riesgo o adecuación

Región Central:

- Datos niño a niño: 2 de cada 3 (65.4%) pasó de DNC a nivel de riesgo o adecuación






Seguimiento niño a niño

2 a 5 años
Línea base: 505 niños

Desnutrición crónica
172 niños (34%) y riesgo
153 niños (30.2%)

1 de cada 3 niños sale
de la DNC (31.5%)



Desnutrición aguda
18 niños (3.5%) y riesgo
72 (14.2%)

2 de cada 3 niños sale
de DNA (64.1%)



Lactancia materna


- 62.4% de nuestros niños, 2 de cada 3, tuvieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, en Colombia 36.1% (ENSIN 2015) y en Latinoamérica 32% (UNICEF 2016).
- Al valorar la lactancia materna total se observa que en nuestros niños la mediana de su duración es 12 meses, cifra inferior a los 14 meses referenciados en la ENSIN 2015





Una mirada a los niños de Bogotá





El caso de Bogotá merece especial atención, ya que es la región con mayor número de niños en primera infancia y que en el caso de este informe reporta la menor tasa de recuperación de los niños:

Región	% De niños que salen del retraso en talla	% De niños que salen del riesgo de retraso en talla	% de niños que salen del estado de adecuación
Bogotá	35.1%	18.1%	40.4%
Caribe	38.1%	32.7%	34.4%
Central	65.4%	30.7%	18.0%
Oriental	49.3%	37.9%	29.8%
Pacífico	65.7%	24.6%	38.1%

- Bogotá, alrededor del 41% de los niños que en su medición inicial se encuentran en adecuación, pasan a un canal menor.



Revisaremos las diferencias regionales entre las principales variables a considerar, para identificar diferencias entre regiones que puedan explicar esta dinámica.



Promedio peso al nacer regional

Región	Promedio peso al nacer (gr)
Bogotá	2747.14
Caribe	2968.87
Central	2913.63
Oriental	3012.94
Pacífico	3000.21

En promedio, el peso al nacer en la población de niños 1000 días en Bogotá, está casi 300 gramos por debajo del de regiones como la Oriental y Pacífico. En la literatura hay evidencia de que el bajo peso al nacer incrementa las probabilidades de sufrir de desnutrición crónica en 2.5 veces



Promedio puntaje Z de Talla para la Edad en la medición inicial por región

Región	Promedio puntaje Z de Talla para la Edad en la medición inicial
Bogotá	-1.44
Caribe	-0.89
Central	-0.76
Oriental	-0.74
Pacífico	-0.49

En Bogotá el puntaje Z promedio de talla para la edad es el más bajo entre todas las regiones, lo cual indica que los niños de Bogotá, en promedio, iniciaron el periodo de medición en peores condiciones que los niños de las demás regiones de Colombia. Este hecho podría explicar la baja tasa de recuperación en esta región.



Proporción de niños con Desnutrición Aguda en primera medición por región

Región	Proporción de niños con Desnutrición Aguda en primera medición
Bogotá	6.8%
Caribe	1.5%
Central	3.2%
Oriental	3.3%
Pacífico	5.7%

- Bogotá y la región pacífica son las que tienen mayor prevalencia de desnutrición aguda, con 6.8% y 5.7% respectivamente. La literatura ha identificado que los niños que han sufrido de desnutrición aguda tienen mayor riesgo de sufrir desnutrición crónica.
- De los niños que pasaron de adecuación a retraso, el 25% iniciaron con desnutrición aguda o riesgo. Esta cifra es del 52% en Bogotá.
- De los niños que pasaron de retraso a adecuación, el 53.5% tenía sobrepeso u obesidad. Esta cifra es del 56.5% en Bogotá



Aunque los indicadores nutricionales evidencian un claro retraso de Bogotá respecto a otras regiones, cuando se analizan indicadores socioeconómicos se observa que Bogotá aventaja en casi todos los aspectos a las demás regiones:

Región	% Madres con Primaria	% Madres con Secundaria	% Madres con Educación Superior	% Madres sin Educación
Bogotá	10.1%	75.7%	13.8%	0.4%
Caribe	15.0%	76.1%	3.1%	5.9%
Central	12.6%	73.5%	12.3%	1.7%
Oriental	10.9%	75.2%	13.6%	0.3%
Pacífico	10.6%	83.2%	6.2%	0.0%

Región	% de población vulnerable según SISBEN
Bogotá	30.0%
Caribe	38.9%
Central	48.5%
Oriental	55.1%
Orinoquía	43.8%
Pacífico	31.6%



Aunque los indicadores nutricionales evidencian un claro retraso de Bogotá respecto a otras regiones, cuando se analizan indicadores socioeconómicos se observa que Bogotá aventaja en casi todos los aspectos a las demás regiones:

Región	Edad promedio de las madres
Bogotá	25.3
Caribe	24.5
Central	23.0
Oriental	24.5
Pacífico	23.8



Aunque los indicadores nutricionales evidencian un claro retraso de Bogotá respecto a otras regiones, cuando se analizan indicadores socioeconómicos se observa que Bogotá aventaja en casi todos los aspectos a las demás regiones:

Región	Promedio Lactancia Materna Exclusiva línea base
Bogotá	5.3
Caribe	4.2
Central	4.0
Oriental	5.2
Pacífico	5.7

Se evidencia que el promedio de lactancia materna exclusiva en Bogotá en los niños 1000 días atendidos por la Fundación es el segundo más alto entre las regiones analizadas, solamente superado por la región pacífica.



¿Qué factores pueden estar afectando este comportamiento en los indicadores de Bogotá?




Bajo peso al nacer



Tiempo de permanencia en el programa

Región	Promedio de meses de permanencia en el programa
Bogotá	10.16
Caribe	16.49
Central	14.32
Oriental	16.23
Pacífico	15.77



La incidencia en planes de desarrollo se hará en torno a tres indicadores clave: desnutrición crónica, desnutrición aguda y bajo peso al nacer



Gracias

